

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
(Kèm theo Văn bản số 309 /CNTY-QLDB và CN ngày 13/7/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/7/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái phát và xảy ra tại 392 hộ, thuộc 138 thôn của 54 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố, số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 1.482 con, tương đương 58.774kg. Để thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh DTLCP; công tác tái đàn chăn nuôi lợn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng tóm tắt một số nội dung tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. BỆNH DTLCP

1. Đặc điểm bệnh DTLCP

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do vi rút gây ra, có thể gây chết lợn với tỷ lệ lên đến 100%.

- Bệnh DTLCP lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi lợn. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị và vắc xin để phòng bệnh.

- Vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi không gây bệnh cho người; Vi rút gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, vi rút có thể tồn tại thời gian dài trong thịt đông lạnh, thịt hun khói, thịt chưa nấu chín...

2. Dấu hiệu nhận biết bệnh DTLCP

- Lợn bỏ ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chõng đống, có biểu hiện đau vùng bụng, cong lưng, ỉa ra máu; Da lợn từ trắng chuyển sang màu đỏ, có xuất huyết vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng có màu sẫm, xanh tím do xuất huyết.

- Khi mổ khám lách sưng to, màu đen do nhồi huyết, nhiều nước trong xoang bụng, hạch màng treo ruột xuất huyết, thận xuất huyết điểm...

3. Đường lây truyền bệnh DTLCP

- Bệnh DTLCP lây nhiễm từ lợn bệnh sang lợn khỏe thông qua tiếp xúc trực tiếp, khi lợn khỏe mạnh tiếp xúc với máu, phân, chất bài tiết của lợn bệnh.

- Lợn khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh khi ăn thức ăn thừa của con người có vi rút gây bệnh (từ nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp) chưa được xử lý nhiệt, nấu chín.

- Lợn có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, bao bì đựng cám, quần áo của người chăn nuôi, nguồn nước có mang mầm bệnh.

4. Các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP

4.1. Đối với địa phương chưa có dịch

- Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

- Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm cho lợn đầy đủ dinh dưỡng; được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của của cơ quan thú y; thường xuyên theo dõi, phát hiện, để có biện pháp can thiệp kịp thời, khi thấy lợn nghi bị bệnh cần báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y nơi gần nhất.

4.2. Đối với vùng có dịch

- Chấp hành quy định về khai báo dịch bệnh, các hộ chăn nuôi khi phát hiện lợn ốm có các biểu hiện nghi mắc bệnh DTLCP phải báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Khi lợn tại hộ mắc bệnh DTLCP cần thực hiện đúng các hướng dẫn của cơ quan thú y để khoanh vùng, xử lý triệt để dịch bệnh, trong đó cần thực hiện triệt để các biện pháp “**6 không**” trong phòng, chống bệnh DTLCP: (1) Không giầu dịch, (2) không bán chạy lợn bệnh, (3) không mua lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh, (4) không

vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng dịch; (5) không vứt xác bừa bãi xác gia súc bệnh ra môi trường; (6) không điều trị lợn mắc bệnh.

4.3. Chế tài xử lý

Các tổ chức, cá nhân cố ý buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh đã được công bố dịch; không tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

II. CÔNG TÁC TÁI ĐÀN

Việc nuôi tái đàn lợn tại các địa phương đã có bệnh DTLCP được thực hiện theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, cụ thể:

1. Nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc đã bị dịch nhưng đã công bố hết bệnh DTLCP, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

2. Chủ cơ sở chăn nuôi phải kê khai với chính quyền cơ sở trước khi thực hiện nuôi tái đàn và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột; nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi, áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn trong chăn nuôi và có sự giám sát của cán bộ chuyên môn tại cơ sở.

3. Chuồng trại: Khu vực chăn nuôi phải rắc vôi bột các lối đi bên trong, bên ngoài chuồng lợn, đặc biệt ở cổng trại, lối ra vào khu trại; phun sát trùng với tần suất ít nhất 1 lần/tuần. Hằng ngày thực hiện việc vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, dụng cụ chăn nuôi; có biện pháp ngăn chặn côn trùng, gặm nhấm, vật nuôi khác để tránh mang mầm bệnh từ ngoài vào trong chuồng, trại chăn nuôi; hạn chế tối đa khách thăm quan, phương tiện ra vào trại, khu chăn nuôi nhất là thương lái và phương tiện vận chuyển thu gom lợn; Phương tiện vận chuyển phải được tiêu độc sát trùng thật kỹ, đúng kỹ thuật, được kiểm soát chặt chẽ

4. Thức ăn chăn nuôi: sử dụng thức ăn dùng trong chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn theo quy định; hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ các nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp. Trường hợp sử dụng thức ăn

thừa phải xử lý nhiệt triệt để diệt được mầm bệnh trong thức ăn; Bổ sung chế phẩm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn;

5. Con giống phải được mua tại cơ sở chăn nuôi có nguồn gốc, an toàn dịch bệnh và được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, có bản cam kết của chủ cơ sở cung cấp con giống; nếu nhập từ tỉnh khác phải có hồ sơ kiểm dịch vận chuyển của cơ quan thú y theo quy định.

6. Các bước nuôi tái đàn: Trước mắt nuôi khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở, sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả âm tính với bệnh DTLCP, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể nuôi tại cơ sở.